

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)	(502) 2251-3560 / 2232-0735
El Salvador	Hospital Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322 / 2232-2415
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 Ext. 1294 Cel: 8755-0983
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)	(507) 523-4948

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS**

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

CYDOME® 30 SC es persistente en suelo. En agua es estable a hidrólisis.

PELIGROS FÍSICO-QUÍMICOS: no corrosivo ni inflamable. En condiciones normales de almacenamiento, el producto no se considera combustible ni con riesgo de explosión. En caso de derrame prevenir la contaminación del agua o alimentos. Si se trata de un derrame de solución o mezcla del producto, cubrir con arena, aserrín u otro material absorbente inerte y recoger el producto absorbido. Colocar el recolectado no utilizable dentro de un recipiente hermético identificado para su posterior eliminación de acuerdo a las regulaciones locales.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO. ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUJES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

No dejar sobrantes en el equipo de aplicación durante ningún período de tiempo. No utilice los envases y empaques vacíos para otros propósitos. No tirar los residuos por el drenaje, elimínese los residuos del producto y sus recipientes como residuos peligrosos y con todas las precauciones posibles. Realice triple lavado a los envases vacíos y utilice este lavado durante la aplicación del producto, posteriormente los envases y empaques vacíos deben destruirse perforándolos y entregarse al centro de acopio más cercano. Prohibido disponer de remanentes o empaques vacíos de **CYDOME® 30 SC** en vertederos, baladeros y/o rellenos sanitarios autorizados o ilegales.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que la composición química del producto está acorde a lo indicado en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con el uso. El formulador no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso no adecuado de este producto.

FORMULADO POR:

SHUIJIAZHANG CITY SENTAY CHEMICAL CO., LTD
South Zhengrao Road, Weisiste Shenze County, Hebei Province, China. Teléfono: 86-311-83631011 Email: sthg2005@sina.com

IMPORTADOR:

GUATEMALA
QUILIBRISA - km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín, Escuintla, Guatemala,
C.A. Teléfonos: + 502 7771 9800

HONDURAS
FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V. - Boulevard del Norte, borde derecho
de Río Blanco, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel.: + 504 2551 307071

GUATEMALA
DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. - Anillo Periférico 17-36 zona 11,
Guatemala, Guatemala, C.A. Teléfono: + 502 2474 9300

NICARAGUA
SAGSA DISAGRO, S.A. - Paso a desnivel Portezuelo 300 metros al Norte,
Managua, Nicaragua, C.A. Tel.: + 505 2249 1640

EL SALVADOR
INFERSA DISAGRO, S.A. DE C.V.
Kilómetro 82.5, Carretera a Sonsonate - Acajutla, PLANTA DISAGRO A1,
Departamento de Sonsonate, El Salvador. Teléfono: + 503 2241 5900

PANAMÁ
ABONOS DEL PACÍFICO, S.A.
El Cabrero, Villa Universitaria, David, Panamá. Teléfonos: +507 7774142

PAÍS	Y	NÚMERO DE REGISTRO
GUATEMALA		357-250
EL SALVADOR		357-250
HONDURAS		1028-857-II
NICARAGUA		DSG-382-2019
PANAMÁ		9995

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,08 g/mL a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

**USO AGRONÓMICO:**

Fungicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

CYDOME® 30 SC es un fungicida que combina la acción preventiva del pyraclostrobin con el efecto curativo del difenoconazole. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada inhibiendo la respiración mitocondrial por bloqueo de la transferencia electrónica al complejo citocromo bc1, la demetilación del esteroil y la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular, deteniendo el desarrollo del hongo. **CYDOME® 30 SC** es absorbido por las hojas con fuerte translocación translaminar y movimiento acropetal.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Es posible aplicar **CYDOME® 30 SC** con equipo terrestre o aéreo, utilizando equipo de aspersión convencional: bomba de mochila manual, motorizada, aspersoras tractorizadas, avión o helicóptero. Asegúrese que el equipo se encuentre limpio, en buenas condiciones y sin fugas antes de su uso. Antes de aplicar **CYDOME® 30 SC** calibre el equipo con agua para garantizar que se está aplicando la dosis correcta. Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco. Utilice equipo de protección personal durante la aplicación: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga y delantal de material impermeable. La velocidad del viento no deberá exceder 8 km/h. Las aplicaciones deberán realizarse durante las horas frescas de la mañana o la tarde, perpendicularmente o contrario a la dirección del viento. La altura de vuelo de las aeronaves sobre la parte terminal de las plantas deberá ser de 2 metros como máximo durante la aplicación.

**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Durante la preparación de la mezcla, se recomienda utilizar agua con pH 5. Durante la preparación y aplicación de la mezcla, utilizar el siguiente equipo auxiliar y de protección: protector de ojos, mascarilla, pantalón y camisa de manga larga, overol o delantal de material impermeable, sombrero, guantes, botas de hule, dosificador y aplicador. Llene el tanque de aspersión con la mitad de agua requerida, agregue la dosis recomendada de **CYDOME® 30 SC**, agite continuamente y complete el volumen de mezcla agregando lentamente el agua restante. Continúe agitando y asegúrese de obtener una mezcla homogénea.

El equipo y utensilios empleados en la mezcla y aplicación, deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo y se les debe proporcionar el mantenimiento necesario.



RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos para Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá:

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Quemado del arroz <i>Pyricularia oryzae</i> Mancha naranja <i>Gaeumannomyces spp.</i> Complejo manchado del grano <i>Alternaria Alternaria solani</i> Curvularia <i>Curvularia lunata</i> Piricularia <i>Pyricularia oryzae</i> Cercospora <i>Cercospora oryzae</i>	0,3 - 0,6 L/ha (0,21 - 0,42 L/mz)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i> Chile pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Oidium <i>Leveillula taurica</i> Podrición gris <i>Botrytis cinerea</i> <i>Alternaria Alternaria solani</i>	0,6 L/ha (0,42 L/mz)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria alternata</i>	0,6 L/ha (0,42 L/mz)
Espárrago <i>Asparagus officinalis</i>	Mancha del peral <i>Stemphylium vesicarium</i> Roya del espárrago <i>Puccinia asparagi</i>	
Arveja <i>Pisum sativum</i> Frijol / Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i>	Oidiosis <i>Erysiphe betae</i>	
Maíz <i>Zea mays</i>	Mancha negra del maíz <i>Phyllachora maydis</i>	0,3 - 0,6 L/ha (0,21 - 0,42 L/mz)
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya del café <i>Hemileia vastatrix</i>	
Fresa <i>Fragaria vesca</i>	Podredumbre gris o Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	
Cebolla <i>Allium cepa</i> Cebollín <i>Allium fistulosum</i> Ajo <i>Allium sativum</i>	Mancha del peral <i>Stemphylium vesicarium</i>	
Frutales	Oidium <i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i>	
Banano y plátano <i>Musa spp.</i>	Mancha del fruto <i>Macrophoma musae</i>	0,4 - 0,6 L/ha (0,28 - 0,42 L/mz)
Brócoli <i>Brassica oleracea var. Itálica</i> Repollo <i>Brassica oleracea var. capitata</i> Coliflor <i>Brassica oleracea var. Botrytis</i> Col de Bruselas <i>Brassica oleracea var. gemmifera</i> Rábano <i>Raphanus sativus</i>	Mancha negra <i>Alternaria brassicae</i>	0,3 - 0,6 L/ha (0,21 - 0,42 L/mz)
Zanahoria <i>Daucus carota</i> Apio <i>Apium graveolens</i> Perejil <i>Petroselinum crispum</i> Cilantro <i>Coriandrum sativum</i>	Tizón foliar <i>Alternaria dauci</i> Oidio <i>Erysiphe polygoni</i> Oidium <i>Leveillula taurica</i> Podredumbre gris o Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Calabaza <i>Cucurbita maxima</i> Guisquil <i>Sechium edule</i>	Cenicilla o Mildiu Polvoriento <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	0,6 L/ha (0,42 L/mz)

Cultivos para Nicaragua:

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS
Citricos <i>Citrus spp.</i> Arroz <i>Oryza sativa</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Antracnosis de los cítricos <i>Colletotrichum sp.</i> Mancha angular <i>Isariopsis griseola</i> Piricularia <i>Pyricularia oryzae</i> Rhizoctonia <i>Rhizoctonia spp.</i> Mustria hilachosa <i>Thanatephorus cucumeris</i>	Para arroz y cítricos: 0,5 L/ha (0,35L/mz) Para frijol: 0,3 - 0,5 L/ha (0,21 - 0,35L/mz)

Se recomienda utilizar un volumen de agua de 200L/ha (140L/mz) para aplicaciones terrestres, variando la dosis según el cultivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Arroz: Realizar una aplicación cada 30 días.

Tomate, berenjena, chile pimiento, cebolla, cebollín y ajo: Aplicar de manera preventiva cada 7 a 10 días.

Papa: Realizar una aplicación cada 10 - 15 días.

Espárragos: Realizar una aplicación cada 10 - 15 días.

Arveja y frijol: Aplicar de manera preventiva cada 12 a 15 días.

Maíz: Dos a tres aplicaciones cada 10 - 15 días.

Café: Aplicar de dos a tres aplicaciones cada 40 - 50 días.

Fresa: Iniciar las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad.

Frutales, melón, pepino, sandía, calabaza y guisquil: Iniciar aplicación cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad, en la época de floración y fructificación a intervalos de 7 días.

Banano y plátano: Realizar una aplicación cada 15 días.

Brocoli, repollo, coliflor, col de bruselas y rábano: Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 5 - 7 días.

Zanahoria, apio, perejil y cilantro: Realizar una aplicación cada 10 - 15 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Café: 45 días.

Arroz, maíz: 35 días.

Arveja: 30 días.

Cebolla, papa: 14 días.

Espárrago: 7 días.

Pimiento, tomate, berenjena, fresa, frutales: 3 días.

Melón, pepino, sandía, calabaza, guisquil: 7 días

Brocoli, repollo, coliflor, col de bruselas, rábano: 14 días

Zanahoria, apio, perejil, cilantro: 14 días

En caso de cultivos de exportación, respetar intervalos acordes a exigencias del país destino.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

CYDOME® 30 SC no causa fitotoxicidad si se aplica en las dosis y usos recomendados.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos de reacción alcalina y ácida ni con agentes oxidantes, sin embargo puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y fitotoxicidad a pequeña escala antes de aplicar el producto en mezclas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios. Almacenar bajo llave fuera del alcance de los niños y personal no autorizado, en un lugar fresco, seco y aireado. Mantener alejado del calor y evitar el contacto directo con la luz solar. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente cuando no esté en uso. Evite derrames y si éstos ocurren cubrir con arena u otro material absorbente inerte.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar irritación leve de los ojos y moderada en la piel. La inhalación puede causar irritación de las membranas mucosas y del tracto respiratorio. Otros síntomas incluyen; salivación, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, irritabilidad, somnolencia, vértigo, incoordinación motora, dolor al caminar y dolor en el pecho.

PRIMEROS AUXILIOS:
EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUzca EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA
TRATAMIENTO MÉDICO:

Tratamiento sintomático y de soporte a funciones vitales.

